

Инструкция по применению препарата Каниквантел Плюс для дегельминтизации собак и кошек

(Организация-разработчик: фирма «Euracon Pharma GmbH», Германия)

I. Общие сведения

Торговое наименование лекарственного препарата: Каниквантел Плюс (Caniquantel Plus).

Международное непатентованное наименование: фенбендазол, празиквантел.

Лекарственная форма: таблетки.

В качестве действующих веществ в 1 таблетке Каниквантела Плюс содержится 500 мг фенбендазола и 50 мг празиквантела, а также вспомогательные вещества: натрия лаурилсульфат - 10 мг, поливидон - 20 мг, ароматизатор со вкусом мяса - 12 мг, магнезии стеарат - до 0,6 г.

По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой плоскую круглой формы таблетку белого цвета массой 0,6 г.

Препарат выпускают расфасованным по 6 или 24 таблеток в блистерах из ламинированной фольги, упакованные в коробки по 48 или 60 или 90 таблеток в картонных коробках и по 120 таблеток в металлических коробках.

Хранят Каниквантел Плюс в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 0°C до 25°C.

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения - 4 года со дня производства.

Лекарственный препарат запрещается применять по истечении срока годности.

Каниквантел Плюс следует хранить в местах, недоступных для детей.

Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. Фармакологические свойства

Каниквантел Плюс относится к комплексным антигельминтикам.

Обладает широким спектром антигельминтного действия на все стадии развития круглых и ленточных гельминтов, паразитирующих у собак и кошек, в т.ч. *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma caninum*, *Trihuris vulpis*, *Echinococcus granulosus*, *Echinococcus multicoloris*, *Taenia* spp., *Dipylidium caninum*, *Diphyllobotrium latum*, *Multiceps multiceps*, *Mesocestoides* spp.

Механизм действия **празиквантела**, входящего в состав препарата, заключается в деполяризации нейромышечных ганглиоблокаторов, нарушении транспорта глюкозы и микротурбулярной функции у цестод, что приводит к нарушению мышечной иннервации, параличу и гибели паразита.

Механизм действия **фенбендазола** основан на ингибировании фумаратредуктазы и синтеза АТФ, стойкой деполяризации мышечных клеток гельминта, нарушении энергетического обмена, что приводит к нарушению мышечной иннервации, параличу, гибели паразита и способствует его элиминации из желудочно-кишечного тракта.

При пероральном введении лекарственного препарата празиквантел и фенбендазол быстро всасываются в кишечнике и распределяются в органах и тканях животного; выводятся из организма в основном с мочой.

Каниквантел Плюс по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

III. Порядок применения

Каниквантел Плюс назначают собакам и кошкам с лечебной и профилактической целью при нематодозах (токсокароз, токскардиоз, унцинариоз, анкилостомоз, трихоцефалез) и цестодозах (тениоз, дипилидиоз, эхинококкоз, дифиллоботриоз, мезоцестодоз).

Каниквантел Плюс не следует применять кормящим и беременным самкам первые две трети беременности, а также щенкам и котятм моложе 3-недельного возраста.

Перед применением Каниквантела Плюс предварительной голодной диеты и применения слабительных средств не требуется.

Препарат применяют животным перорально индивидуально из расчета 1 таблетка на 10 кг массы животного однократно в утреннее кормление с небольшим количеством корма.

В случае отказа животного от корма с антигельминтиком препарат вводят принудительно на корень языка или в виде водной суспензии.

Для приготовления водной суспензии таблетку Каниквантела Плюс измельчают, суспендируют в 10 мл воды, интенсивно взбалтывают и тотчас вводят животному при помощи шприца с катетером из расчета 1 мл суспензии на 1 кг массы животного.

С профилактической целью животных дегельминтизируют ежеквартально в терапевтической дозе.

Симптомов, возникающих при передозировке препарата, не установлено.

Особенностей действия лекарственной препарата при первом приеме или при его отмене не выявлено.

В случае несоблюдения установленного срока повторных обработок применение препарата следует возобновить в той же дозировке и по той же схеме.

Побочных явлений и осложнений при применении Каниквантела Плюс в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к активным компонентам препарата, возможны повышенная саливация, диарея или рвота. Указанные симптомы кратковременны, самопроизвольно исчезают и не требуют применения лекарственных средств.

Не рекомендуется применять Каниквантел Плюс с препаратами, содержащими пиперазин, ввиду возможного снижения эффективности.

Каниквантел Плюс не предназначен для применения продуктивным животным.

IV. Меры личной профилактики

При работе с препаратом Каниквантел Плюс следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

Людам с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Каниквантелом. При случайном попадании препарата на кожу или слизистые оболочки его необходимо тотчас смыть проточной водой с мылом. В случае появления аллергических реакций и/или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Пустые упаковки из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей; они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

Организация-производитель: «Euracon Pharma GmbH»; Max-Planck-Str. 11-D 86, Unterschleißheim, Германия.