

ОДОБРЕНО

Совет по ветеринарным препаратам
протокол от 19 июня 2019 г. № 102

ИНСТРУКЦИЯ

по применению ветеринарного препарата «Бравекто Спот Он» (Раствор для наружного нанесения)

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Бравекто Спот Он (Bravecto Spot On).

Существуют следующие разновидности препарата:

«Бравекто Спот Он для собак 112,5 мг» (Раствор для наружного нанесения для собак очень мелких пород (2 – 4,5 кг));

«Бравекто Спот Он для собак 250 мг» (Раствор для наружного нанесения для собак мелких пород (>4,5 – 10 кг));

«Бравекто Спот Он для собак 500 мг» (Раствор для наружного нанесения для собак средних пород (>10 – 20 кг));

«Бравекто Спот Он для собак 1000 мг» (Раствор для наружного нанесения для собак крупных пород (>20 – 40 кг));

«Бравекто Спот Он для собак 1400 мг» (Раствор для наружного нанесения для собак очень крупных пород (>40 – 56 кг));

«Бравекто Спот Он для кошек 112,5 мг» (Раствор для наружного нанесения для кошек мелких пород (1,2 – 2,8 кг));

«Бравекто Спот Он для кошек 250 мг» (Раствор для наружного нанесения для кошек средних пород (>2,8 – 6,25 кг));

«Бравекто Спот Он для кошек 500 мг» (Раствор для наружного нанесения для кошек крупных пород (>6,25 – 12,5 кг)).

1.2 В 1,0 мл препарата содержится 280 мг флуранелера и вспомогательные вещества до 1 мл.

1.3 По внешнему виду препарат представляет собой прозрачный раствор от бесцветного до желтого цвета.

1.4 Бравекто Спот Он выпускают в пипетках, упакованных в ламинированные алюминиевые пакеты-саше по 0,4 мл (Бравекто Спот Он 112,5 мг, для кошек мелких пород); 0,89 мл (Бравекто Спот Он 250 мг, для кошек средних пород); 1,79 мл (Бравекто Спот Он 500 мг, для кошек крупных пород); 0,4 мл (Бравекто Спот Он 112,5 мг, для собак очень мелких пород); 0,89 мл (Бравекто Спот Он 250 мг, для собак мелких пород); 1,79 мл (Бравекто Спот Он 500 мг, для собак средних пород); 3,57 мл (Бравекто Спот Он 1000 мг, для собак крупных пород) и 5,0 мл (Бравекто Спот Он 1400 мг, для собак очень крупных пород), закрывающиеся колпачком из полиэтилена высокой плотности. Пипетки упакованы по 1 или 2 штуки в картонные коробки вместе с инструкцией по применению. Перед применением Бравекто Спот Он необходимо ознакомиться с инструкцией по его применению.

1.5 Препарат хранят в защищенном от влаги месте, при температуре от плюс 2 °С до плюс 30 °С. Не замораживать. Бравекто Спот Он следует хранить в недоступном для детей месте.

1.6 Срок годности препарата – 2 года от даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортировки. Запрещается применять лекарственный препарат по истечении срока годности.

1.7 Бравекто Спот Он отпускают без рецепта ветеринарного врача.

2 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

2.1 Флуранелер, входящий в состав препарата, является инсектоакарицидом. Он эффективен против иксодовых клещей (*Ixodes ricinus*, *Ixodes scapularis*, *Ixodes hexagonus*,

Dermacentor reticulatus, *Haemaphysalis elliptica* и *Rhipicephalus sanguineu*), *Sarcoptes spp.*, *Otodectes spp.*), блох (*Ctenocephalides felis u C.canis*).

Флураланер является сильнодействующим ингибитором некоторых частей нервной системы членистоногих, действуя антагонистически на потенциалнезависимые каналы-переносчики для ионов хлора (ГАМК-рецептор и глутамат-рецептор).

2.2 После местного применения флураланер быстро абсорбируется в шерстный покров, кожу и прилегающие ткани, откуда он медленно поступает в сосудистую систему. Уровень плато достигается в плазме через 7 – 63 дней после применения, после чего концентрация медленно снижается. Флураланер хорошо распределяется в тканях и достигает высоких концентраций в жировой ткани, печени, мышцах и почках. Длительная сохранность и медленное выведение из плазмы и отсутствие интенсивного метаболизма обеспечивают эффективные концентрации флураланера в течение интервала времени между применениями препарата. Флураланер в неизмененном виде выводится с экскрементами и, в очень незначительной степени, с мочой.

2.3 Бравекто Спот Он вызывает гибель блох, паразитирующих на собаке, через 8 часов после начала питания, иксодовых клещей – через 12 часов после прикрепления.

Бравекто Спот Он вызывает гибель блох, паразитирующих на кошке, через 8 часов после начала питания, иксодовых клещей – через 48 часов после прикрепления.

3 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

3.1 Бравекто Спот Он применяют кошкам и собакам для лечения и профилактики заражения клещами и блохами, а также для лечения саркоптоза, вызванного *Sarcoptes spp.*, у собак и отодектоза, вызванного *Otodectes spp.*, у собак и кошек, а также для снижения риска бабезиоза у собак. Может использоваться как часть комплексного лечения аллергического дерматита, вызываемого блохами.

Инсектоакарицидное действие у кошек и собак сохраняется в течение 12 недель.

3.2 Непосредственно перед применением вскрывают один пакет-саше и достают пипетку. Для открытия пипетку следует удерживать у основания или за верхнюю часть ниже колпачка в вертикальном положении (наконечником вверх). Откручивающийся колпачок поворачивают в направлении или против часовой стрелки на один полный оборот. Колпачок остается на пипетке – его невозможно удалить полностью. Пипетка является открытой и готова к применению, когда ощущается щелчок от разлома уплотнения.


3.3 Метод применения и дозы для кошек:

3.3.1 Бравекто Спот Он кошкам применяют в соответствии с приведенной ниже таблицей (соответствует одной дозе 40 – 94 мг флураланера в расчете на 1 кг массы тела).

Масса тела кошки (кг)	Активность и количество применяемых пипеток		
	Бравекто Спот Он 112,5 мг	Бравекто Спот Он 250 мг	Бравекто Спот Он 500 мг
1,2 – 2,8	1		
>2,8 – 6,25		1	
>6,25 – 12,5			1

Для кошек с массой тела более 12,5 кг используют сочетание двух пипеток, которое больше всего соответствует массе тела.

3.3.2 В ходе применения препарата кошка должна стоять или лежать так, чтобы ее спина находилась в горизонтальном положении. Наконечник пипетки размещают над головой кошки.



3.3.3 Аккуратно сдавливают пипетку, нанося все содержимое пипетки непосредственно на кожу кошки. Для кошек весом до 6,25 кг препарат следует наносить в одном месте, в области основания черепа; для кошек весом свыше 6,25 кг – в двух местах.

3.4 Метод применения и дозы для собак:


3.4.1 Бравекто Спот Он собакам применяют в соответствии с приведенной ниже таблицей (соответствует одной дозе 25 – 56 мг флуруаланера в расчете на 1 кг массы тела).

Масса тела собаки (кг)	Активность и количество применяемых пипеток				
	Бравекто Спот Он 112,5 мг	Бравекто Спот Он 250 мг	Бравекто Спот Он 500 мг	Бравекто Спот Он 1000 мг	Бравекто Спот Он 1400 мг
2 – 4,5	1				
>4,5 – 10		1			
>10 – 20			1		
>20 – 40				1	
>40 – 56					1

Для собак с массой тела более 56 кг используют сочетание двух пипеток, которое больше всего соответствует массе тела.

3.4.2 В ходе применения препарата собака должна стоять или лежать так, чтобы ее спина находилась в горизонтальном положении. Наконечник пипетки размещают вертикально над участком кожи между лопатками собаки.

3.4.3 Аккуратно сдавливают пипетку, нанося все содержимое пипетки непосредственно на кожу собаки в одном месте (в случае небольшого объема пипетки) или нескольких местах вдоль позвоночника от холки до хвоста. Не следует наносить чрезмерное количество раствора в одно место, поскольку это может вызвать стекание некоторой части раствора с животного.



3.5 Для оптимального контроля заражения блохами и клещами данный препарат следует применять у собак и кошек с интервалами 12 недель.

3.6 Не применять в случае известной аллергии к действующему веществу.

3.7 Собакам препарат можно применять в период беременности и лактации. О применении препарата кошкам в период беременности и лактации нет данных.

У собак в отдельных случаях в месте применения могут отмечаться местные кожные реакции, в частности, покраснение или выпадение шерстного покрова. У кошек в отдельных случаях в месте применения могут отмечаться кожные реакции, в частности, покраснение или зуд. Вскоре после применения у кошек возможны вялость/судороги/анорексия или тошнота/повышенное слюноотделение.

3.8 Передозировка. После применения у щенков в возрасте 8 недель и старше и с массой тела свыше 2,0 кг не отмечено никаких побочных эффектов передозировки вплоть до 5-кратной максимальной рекомендуемой дозы и 3-х применений с более короткими интервалами (8 недель), чем рекомендовано в инструкции.

После применения у котят в возрасте 11 недель и старше и с массой тела свыше 1,2 кг не отмечено никаких побочных эффектов передозировки вплоть до 5-кратной максимальной рекомендуемой дозы и 3-х применений с более короткими интервалами (8 недель), чем рекомендовано в инструкции.

3.9 Предостережения при применении животным.

Не допускать попадания данного препарата в глаза животным.

Нельзя наносить непосредственно на поврежденные участки кожи.

Не допускать контакта с обработанными участками (места применения) до высыхания.

Собакам и кошкам не следует позволять плавать в водоемах, погружать в воду или мыть их в течение 3 дней после применения препарата.

В связи с отсутствием информации, данный препарат не следует применять: щенкам в возрасте младше 8 недель и/или собакам с массой тела менее 2,0 кг; котят в возрасте младше 11 недель и/или кошкам с массой тела менее 1,2 кг. Бравекто Спот Он не предназначен для применения сельскохозяйственным продуктивным животным.

4 МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

4.1 При работе с препаратом следует соблюдать общепринятые правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные для работы с ветеринарными лекарственными средствами.

4.2 В случае попадания препарата на кожу или в глаза, необходимо тщательно промыть участок, на который попал препарат, чистой водой. После использования препарата необходимо вымыть руки.

4.3 Этот препарат является легковоспламеняющимся. Держать вдали от источников тепла, открытого огня или других источников возгорания.

5 ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата его использование прекращают, и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на территории которого он находится.



Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на организм животного ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, пишется акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» для подтверждения на соответствие требованиям нормативных документов.

6 ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

6.1 Производитель: «Патеон Мэньюфэчуринг Сервисэз ЛЛС» (Patheon Manufacturing Services LLC), 5900 Мартин-Лютер-Кинг-Дж. Хайвей, Гринвилл, Северная Каролина (NC) 27834 США.

Ответственный за выпуск партии препарата «Мерк Энимал Хэлс» (Merck Animal Health),
10488 Саус 136-я стрит, Омаха, Небраска 68138 США

Инструкция подготовлена главным специалистом по регистрации ветеринарных препаратов СООО «Агросайт» Терешко А.А. и заведующим кафедрой микробиологии и вирусологии УО ВГАВМ Вербицким А.А.

Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь	
Совет по ветеринарным препаратам	
ОДОБРЕНО	
Председатель	
Секретарь	
Эксперт	
«19 июня 2019» протокол № 102	