

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Руководителя
Россельхознадзора



Н.А. ВЛАСОВ

15.07.2020

ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата
АНАНДИН® капли глазные и интраназальные

(Организация-разработчик: ООО «НВЦ Агроветзащита»,
Россия, 129329, г. Москва, Игарский проезд, д. 4, стр. 2)

Номер регистрационного удостоверения 78-3-7.12-0688 НТВР-3-2.0/00339

I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:

торговое наименование – АНАНДИН® капли глазные и интраназальные (ANANDIN® eye drops and intranasal);

международное непатентованное или химическое наименование – глюкаминопропилкарбакридон.

2. Лекарственная форма: капли глазные и интраназальные.

Лекарственный препарат в качестве действующего вещества содержит глюкаминопропилкарбакридон – 20 мг/мл и вспомогательные вещества: глицерин, метиленовый синий и воду для инъекций.

3. По внешнему виду препарат представляет собой прозрачную жидкость светло-зеленого цвета.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя – 2 года со дня производства, после вскрытия флакона-капельницы – 28 суток. Запрещается применять препарат по истечении срока годности.

4. Выпускают АНАНДИН® капли глазные и интраназальные расфасованным по 7 мл в полимерные флаконы-капельницы, укупоренные навинчиваемыми полимерными крышками с контролем первого вскрытия. Флаконы-капельницы индивидуально помещают в картонную пачку и снабжают инструкцией по применению препарата.

5. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 2 °С до 25°С.

6. Лекарственный препарат хранят в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. АНАНДИН® капли глазные и интраназальные относятся к фармакотерапевтической группе – иммуномодуляторы.

10. Глюкаминопропилкарбакридон, входящий в состав препарата, является низкомолекулярным индуктором цитокинов, обладает противовоспалительным и ранозаживляющим действием, стимулирует выработку эндогенного интерферона, повышает функциональную активность Т-лимфоцитов и макрофагов, активизирует продукцию противовоспалительных цитокинов.

При местном применении препарата максимальная концентрация глюкаминопропилкарбакридона в крови отмечается через 1 час; его накопления в организме при курсовом применении не происходит, соединение полностью выводится с мочой в неизменном виде.

АНАНДИН® капли глазные и интраназальные по степени воздействия на организм относятся к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывают местно-раздражающего, резорбтивно-токсического и сенсибилизирующего действия.

III. Порядок применения

11. АНАНДИН® капли глазные и интраназальные назначают собакам и кошкам в составе комплексной терапии конъюнктивитов и ринитов различной этиологии.

12. Противопоказанием к применению АНАНДИН® капель глазных и интраназальных является индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам лекарственного препарата (в том числе в анамнезе).

13. При работе с АНАНДИН® капли глазные и интраназальные следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с АНАНДИН® капли глазные и интраназальные. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. Флаконы-капельницы из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

14. Самкам в период беременности и вскармливания приплода АНАНДИН® капли глазные и интраназальные, при необходимости, применяют под контролем ветеринарного врача.

15. При конъюнктивитах лекарственный препарат закапывают по 2-3 капли за нижнее веко два раза в день, при ринитах – по 2-4 капли в каждый носовой ход два-три раза в день. Лечение проводят до выздоровления животного, но не более 14 дней.

16. При применении лекарственного препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается. При

повышенной индивидуальной чувствительности и появлении аллергических реакций использование препарата прекращают и при необходимости назначают животному антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

17. Симптомы передозировки при применении препарата не выявлены.

18. Сведения о несовместимости препарата АНАНДИН® капли глазные и интраназальные с лекарственными средствами других фармакологических групп, кормами и кормовыми добавками отсутствуют.

19. Особенности действия препарата при его первом применении и при отмене не выявлено.

20. Следует избегать нарушений режима дозирования и схемы применения лекарственного препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности.

21. АНАНДИН® капли глазные и интраназальные не предназначены для применения продуктивным животным.

Наименование и адрес производственных площадок производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.

ООО «АВЗ С-П», Россия, 141305, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д. 1.

ООО «НИО «МЕДИТЭР», Россия, 196608, Санкт-Петербург, г. Пушкин, шоссе Подбельского, д. 9, лит. А.

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

ООО «АВЗ С-П», Россия, 141305, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д. 1