

Свидетельство о Государственной регистрации лекарственного препарата для ветеринарного применения 77-3-28.13-1656№ ПВР -1-3.8\02165 от 15.11.2013, выданного Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору; Инструкция по применению от 15.11.2013

## Аннотация

«Субтилис-Ж<sup>тм</sup>»

Пробиотическое лекарственное средство для животных

(для домашних питомцев: собак, кошек, кроликов, пушных зверей, птиц, рыб)

**Лекарственная форма** – суспензия.

**Упаковка:** Тубы полимерные «Strip monodoze» (далее доза) объемом 1мл., в упаковке 10 шт.

**Состав:** микробная масса живых природных штаммов микроорганизмов *Bacillus subtilis* и *Bacillus licheniformis*, вода. 1 доза содержит не менее  $5 \times 10^9$  КОЕ.

**Действие препарата:** Бактерии *B. Subtilis* и *B. licheniformis* образуют в желудочно-кишечном тракте быстро растущие колонии и вытесняют из него патогенные и условно-патогенные микроорганизмы, стимулируя при этом рост полезной микрофлоры хозяина. Продуцируются биологически активные вещества, происходит синтез протеаз, липаз, амилаз и других пищеварительных ферментов, активируются специфические и неспецифические системы защиты организма, нормализуется пищеварение, улучшается усвояемость кормов, повышается иммунный статус и устойчивость организма к заболеваниям инфекционной, микозной, инвазионной и алиментарной этиологии.

**Показания к применению:**

«Субтилис-Ж<sup>тм</sup>» показан в качестве естественного антагониста патогенным и условно-патогенным микроорганизмам широкого спектра: *Salmonella*, *Shigella*, энтеропатогенные *E. coli*, *Proteus*, *Staphylococcus*, *Candida*, аэро и псевдомонадам и т.д., а также в качестве дополнительного источника пищеварительных ферментов амило-липазной группы.

**Применяется для профилактики и лечения:**

- заболеваний желудочно-кишечного тракта, вызываемых патогенными микроорганизмами, нормализации кишечной микрофлоры и повышения иммунитета;
- для восстановления микрофлоры кишечника при дисбактериозах;
- оказывает антитоксическое действие при поражениях организма животных, птиц и рыб алиментарными или инфекционными агентами;
- для повышения эффективности вакцинаций.

**Применение и дозы:**

«Субтилис-Ж<sup>тм</sup>» предпочтительно дается непосредственно в рот, а также с питьём или кормом, но объём лекарственного питья или корма должен потребляться за один приём:

- собакам и пушным зверям - по 1 дозе в день 5 дней подряд;
- кроликам - 0.1 дозы (3 капли) 5 дней подряд;
- кошкам - 0.5 дозы (15 капель) 5 дней подряд;
- птице - 0.3 дозы (10 капель) 10 дней подряд с повтором курса через 20 дней;
- рыбам (карповым, лососевым, осетровым) дается из расчета 0.2 дозы (6 капель) на 1 кг живой массы с кормом или добавляя в воду (1 доза на 100 литр воды) в течение 10 дней.

Щенкам, котяткам, крольчатам, цыплятам препарат рекомендуется использовать в тех же дозировках повторно с перерывом 1 неделю.

**Порядок применения:**

1. Достать из упаковки тубу.
2. Повернуть и отделить носовую часть.
3. Открыть рот животному или птице.
4. Выдавить содержимое в рот полностью или необходимое количество капель.
5. Закрыть рот и дожидаться глотательного рефлекса.
6. При даче с водой или кормом - выдавить необходимую дозу препарата в требуемый объём воды или корма и тщательно перемешать.

**Важно:** перед вскрытием энергично встряхивать в течение нескольких секунд. Открытый неиспользованный препарат хранить в холодильнике не более 5 дней.

**Условия и сроки хранения:** хранить в сухом прохладном месте не более 24 месяцев с даты выпуска, указанной на упаковке.

**Противопоказания:** не выявлены. Негативные последствия от передозировки препарата отсутствуют.

**Производитель:** ООО «НИИ Пробиотиков»,

113556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 74/1

Тел./Факс: (499) 619-57-68; 610-66-36;

Email: [subtilis@subtilis.ru](mailto:subtilis@subtilis.ru) Сайт: [www.subtilis.ru](http://www.subtilis.ru)

**Примечание:** указанные дозировки, а также кратность являются минимальными и в случае необходимости могут быть увеличены.