

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

И.А. ВЛАСОВ
01.03.2017

ИНСТРУКЦИЯ

по применению препарата СЕКС БАРЬЕР® таблетки для кошек и сук
для регуляции половой охоты у кошек и сук

(организация-разработчик ООО «НПК «СКИФФ» 117246, г. Москва
ул. Научный проезд, д. 20 стр.3)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: СЕКС БАРЬЕР®
таблетки для кошек и сук (SEX BARRIER® tabulettae pro felis et canis feminae).

Международное непатентованное наименование лекарственного препарата:
мепрегенолацетат и этинилэстрадиол.

2. Лекарственная форма: таблетки для перорального применения.

Бигормональный контрацептивный лекарственный препарат СЕКС БАРЬЕР®
таблетки для кошек и сук в качестве действующих веществ в 1 таблетке массой
100 мг содержит: мепрегенолацетат водорастворимый – 0,100 мг, этинилэстрадиол
– 0,001 мг.

В качестве вспомогательных веществ СЕКС БАРЬЕР® таблетки для кошек и
сук содержит: лактозу, кальция стеарат, краситель пищевой.

3. По внешнему виду препарат представляет собой таблетки овальные,
двухцветные: белого или белого с сероватым оттенком цвета с одной стороны и
от светло-розового до темно-розового цвета с логотипом «СБ» с другой стороны.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения
в закрытой упаковке – 2 года со дня производства.

Лекарственный препарат СЕКС БАРЬЕР® таблетки для кошек и сук
запрещается применять по истечении срока годности.

4. Лекарственный препарат СЕКС БАРЬЕР® таблетки для кошек и сук
выпускают расфасованным по 10 таблеток в блистере. Блистер с лекарственным
препаратом помещают в картонную пачку с инструкцией по применению.

5. Хранить лекарственный препарат следует в закрытой упаковке
производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от
пищевых продуктов и кормов, при температуре от 0°C до 25°C.

6. Лекарственный препарат СЕКС БАРЬЕР® таблетки для кошек и сук
следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с
требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Фармакотерапевтическая группа: гормоны и их антагонисты.

10. Входящие в состав лекарственного препарата гестаген (мепрегенолацетат) и эстроген (этинилэстрадиол), воздействуя на гипоталамо-гипофизарную систему животных, снижают секрецию из гипофиза гонадотропных гормонов (ФСГ и ЛГ). Вследствие этого происходит угнетение фолликулогенеза в яичниках и прекращается овуляция фолликулов.

Этинилэстрадиол в комплексе с мепрегенолацетатом усиливает контрацептивный эффект, изменяя биологические свойства влагалищной среды, повышает вязкость слизи шейки матки, что тормозит подвижность сперматозоидов, а изменения в эндометрии матки препятствуют имплантации оплодотворенной яйцеклетки.

Действующие вещества лекарственного препарата хорошо всасываются в кишечнике и, биотрансформируясь в печени, полностью выводятся из организма с мочой в виде метаболитов в течение 48 часов.

Лекарственный препарат СЕКС БАРЬЕР[®] таблетки для кошек и сук по степени воздействия на организм относят к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывают отрицательного влияния на организм животных.

III. Порядок применения

11. Бигормональный контрацептивный лекарственный препарат СЕКС БАРЬЕР[®] таблетки для кошек и сук применяют кошкам и сукам для регуляции половой охоты (прерывания и задержки течки), предотвращения нежелательной беременности.

12. Лекарственный препарат противопоказан собакам породы грейхаунд, беременным и кормящим самкам, животным, не достигшим половой зрелости, а также при новообразованиях молочной железы, заболеваниях половых органов, при сахарном диабете, мочекаменной болезни и при индивидуальной непереносимости компонентов.

Не рекомендуется давать кошкам и сукам лекарственный препарат, предназначенный для котов и кобелей вследствие различного гормонального фона женских и мужских особей.

13. Лекарственный препарат вводят перорально с кормом или принудительно на корень языка.

Дозировка зависит от массы тела животного и цели применения (см. таблицу 1).

Таблица 1

Вид животного	Назначение ЛП		Масса тела животного, кг	Дозировка	Курс применения	Начало приема / примечания
Кошки	Регуляция половой охоты	Прерывание течки	До 5 кг	1 таблетка	1 раз в день в течение 3-5 дней	1. Не позднее 2-х дней с момента начала течки. 2. Повторный курс проводят по необходимости.
			5,1 - 10 кг	1-2 таблетки		
		Задержка течки, поддержание успокаивающего эффекта	Независимо от массы тела животного	1 таблетка	Регулярно 1 раз в 14 дней	1. В период покоя или через 10 дней после исчезновения признаков половой охоты. 2. Может проводиться регулярно без перерывов.
	Предотвращение нежелательной беременности после случайного спаривания		Независимо от массы тела животного	2 таблетки	однократно	Не позднее 24 часов после случайного спаривания
Суки	Регуляция половой охоты	Прерывание течки	до 5 кг	1 таблетка	1 раз в день в течение 3-5 дней	1. Не позднее 2-х дней с момента начала течки. 2. Прерывание течки рекомендуется проводить не более 1-го раза в год.
			5,1-10 кг	1-2 таблетки		
		Задержка течки	10,1-30 кг	2-4 таблетки	1 раз в день в течение 5-7 дней	1. За 7-14 дней до предполагаемой течки. 2. Позволяет сдвинуть течку примерно на 20-40 дней. 3. Задержку течки рекомендуется проводить не более 2-х раз в год.
	свыше 30 кг		4+1 таблетка на каждые последующие 10 кг массы тела			
Предотвращение нежелательной беременности после случайного спаривания					1 раз в день в течение 2-х дней	Не позднее 24 часов после случайного спаривания

Молодым самкам в первую течку применять не рекомендуется из-за трудности определения времени начала половой охоты.

Через 2-3 месяца после отмены лекарственного препарата происходит полное восстановление репродуктивной функции организма.

14. Симптомы передозировки при применении лекарственного препарата не выявлены.

15. Особенности действия лекарственного препарата СЕКС БАРЬЕР® таблетки для кошек и сук при первом применении или при отмене не установлено.

16. Применение лекарственного препарата СЕКС БАРЬЕР® таблетки для кошек и сук беременным самкам, в период лактации, а также у потомства до достижения ими половозрелого возраста запрещено.

17. Следует избегать пропусков очередной дозы лекарственного препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае несоблюдения установленного срока повторного применения препарата, его следует применить как можно быстрее, в той же дозировке и по той же схеме.

При задержке в приеме лекарственного препарата менее 12 часов,

терапевтическая эффективность не снижается.

18. Побочных явлений и осложнений при применении лекарственного препарата СЕКС БАРЬЕР® таблетки для кошек и сук в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается.

При индивидуальной непереносимости компонентов лекарственного препарата его применение прекращают.

19. Информация об особенностях взаимодействия с другими лекарственными препаратами отсутствует.

20. Лекарственный препарат СЕКС БАРЬЕР® таблетки для кошек и сук не предназначен для применения продуктивным животным.

IV. Меры личной профилактики

21. При применении лекарственного препарата СЕКС БАРЬЕР® таблетки для кошек и сук следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.

22. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом СЕКС БАРЬЕР® таблетки для кошек и сук. Пустую тару из-под лекарственного препарата, запрещается применять для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

23. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством проточной воды. В случае проявления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Наименования и адреса
производственных площадок
производителей лекарственного
препарата для ветеринарного
применения.

ООО «НВП «Астрафарм», 117246,
г. Москва, Научный проезд, дом 20,
стр. 3. Тел/факс: (495) 785-83-50/70.

Наименование, адрес организации,
уполномоченной держателем или
владельцем регистрационного
удостоверения лекарственного препарата
на принятие претензий от потребителя.

ООО «НВП «Астрафарм» 117246,
г. Москва, Научный проезд, дом 20,
стр. 3

С согласованием настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению препарата СЕКС БАРЬЕР® таблетки для кошек и сук, утвержденная Россельхознадзором 15 ноября 2011 года.

Номер регистрационного удостоверения 77-3-2.17-2582.1178P-3-10/00311